

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮痒消炎剤

金属かぶれなどによるしつこいかゆみ、くつきり赤み、ガサザラ[®]肌に

MUHI[®]メタレス

販売名：ムヒメタレス

ファッションの多様化により、金属にかぶれる人が多くなっています。金属かぶれは、ネックレス、腕時計、指輪、下着の金具、メガネ、ベルトなどに含まれる金属が肌に接触することで発症します。金属にかぶれると2種類の炎症が起こり、その結果、しつこいかゆみやくつきり目立つ赤みだけでなく、ガサザラとした肌状態を引き起こすこともあります。

■金属かぶれ症状の発生プロセス


プロセス①：2種類の炎症が発生

ネックレスや腕時計などが肌に触れると、金属がイオン化して溶け出します。溶け出した金属は肌の奥まで入り込み、「一般的なアレルギー性の炎症」だけでなく「**金属による特徴的^{*}な炎症**」の2種類の異なる炎症を引き起こします。

※ニッケルによるかぶれにおいて

プロセス②：炎症が悪化

金属による特徴的な炎症が肌細胞を刺激して、炎症悪化物質を放出させます。その結果、2種類の炎症はどんどん悪化し、「しつこいかゆみ・くつきり赤み・ガサザラ肌」といった、金属かぶれ症状を引き起こします。



〔模式図〕

■Wの抗炎症作用で金属かぶれを治療！

ムヒメタレスは、Wの抗炎症作用で金属かぶれ症状を引き起こす元となる2種類の炎症をしっかりと抑えることにこだわった治療薬です。

Wの抗炎症作用でかぶれ症状の元となる
2種類の炎症をしっかりと抑える

エルゴカルシフェロール
(金属による特徴的な炎症を抑える)

PVA
(炎症全体を抑える)

金属による
特徴的な
炎症

一般的な
アレルギー性
の炎症

すばやくかゆみを鎮める

ジフェンヒドラミン塩酸塩
(かゆみ止め成分)

ℓ-メントール、dl-カンフル
(清涼感成分)

しつこい
かゆみ

くつきり
赤み

〔模式図〕

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 顔面には、広範囲に使用しないでください
- 長期連用しないでください(目安として顔面で2週間以内、その他の部位で4週間以内)

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(裏面につづく)

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮 膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

かぶれ、かゆみ、しっしん、皮ふ炎、あせも、じんましん、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分とそのはたらき 有効成分 (100 g中)

成 分	分 量	は た ら き
エルゴカルシフェロール	1.25 mg	炎症を抑える作用を示します。
プレドニゾン吉草酸エステル 酢酸エステル(PVA)	0.15 g	アンテドラッグ型抗炎症成分で、かゆみや赤みの元となる炎症をしっかり抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0 g	かゆみ原因物質(ヒスタミン)のはたらきをブロックし、起きているかゆみをすばやく鎮めます。
ℓ-メントール	3.5 g	清涼感を与え、かゆみをすばやく鎮めます。
dℓ-カンフル	1.0 g	清涼感を与え、かゆみをすばやく鎮めます。
クロタミトン	5.0 g	かゆみを鎮めます。

添加物としてエドト酸Na、BHT、カルボキシビニルポリマー、ステアリルアルコール、トリスオクタノ酸グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ポリソルベート60、ジイソプロパノールアミン、リン酸水素Naを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)次の物には付着しないように注意してください(変質する場合があります)。
アクセサリ類、腕時計、メガネ、プラスチック類、繊維製品、皮革製品等。
- (5)使用期限(ケース及びチューブに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。
使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

お手当てのポイント

☆まずは、かぶれを起こした金属の使用を中止しましょう。

☆化膿している患部やジュクジュクした汁が出る症状には使わないでください。特にピアスによるかぶれでは、このような症状が起こりやすいため、患部の症状を確認してください。

☆肌がガサザラとしているのは、まだ金属かぶれの炎症が治まっていないサインです。ガサザラとしているのに途中で治療をやめてしまうと、かぶれがぶり返す原因になります。目安として、かゆみや赤みだけでなく、ガサザラが治るまで本剤を使用してください。

お子さまが誤ってムヒメタレスを口にした場合

- ①まず、口の中の物をふき取ってあげてください。
- ②少しなめた程度では影響はありません。ただし、たくさん口にとると眠気があらわれることがあります。
- ③1時間ほど様子を見て、呼吸などに異常がある場合は、医師に診てもらってください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00)