



第3類医薬品 ムヒパッチA 76枚入

副作用被害救済制度の問合せ先
 (独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouin/gai.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

第3類医薬品 ムヒパッチA 虫さされ・かゆみに
 はるかゆみ止め

虫さされ・かゆみに

かきむしりを防ぐ
 さわやかな清涼感
 殺菌配合

かゆみ
 止める

ムヒパッチA
 76枚入

第3類医薬品 ムヒパッチA 虫さされ・かゆみに
 はるかゆみ止め

801

第3類医薬品 ムヒパッチA 76枚入

虫さされ・かゆみに
 はるかゆみ止め

第3類医薬品

AA12

販売名 ムヒパッチA

第3類医薬品

鎮痒消炎剤

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
 次の部位には使用しないでください
 傷口、湿潤、かきこわし、ただれ、かぶれ、目の周囲、粘膜、顔

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 (1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、このケースをもって医師又は薬剤師に相談してください
 (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

 (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合。

効能 虫さされ、かゆみ、しもやけ

お客様相談窓口 ☎ 076-472-0911
 [月～金(祝日を除く) 9:00～17:00]

発売元 **muhi** 株式会社 池田模範堂
 富山県中新川郡上市町神田16番地
 製造販売元 株式会社 大石青盛堂
 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地



4 987426 300227

使用期限(年、月) 製造番号

用法・用量 パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼付してください。
 (用法・用量に関連する注意)

(1) 1回の使用は4～5時間を目安とし、同じ場所に長時間の使用はさけてください。皮膚の弱い方は、本剤を同じ場所に続けて使用しないでください。まれに貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがあります。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は1才以上です。(3) 汗をかいたり、皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。

有効成分 1.25m²(膏体100g)中
 ジフェンヒドラミン(かゆみ止め成分) 1.0g/イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤) 1.0g/8-メントール(清涼感剤) 3.0g
 添加物として生ゴム、ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、エステルガム、ポリブテン、テルペン樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、脂環族炭酸塩和炭化水素樹脂を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 小児の手のとどかない所に保管してください。(2) 高温を避け、直射日光の当たらない湿度の少ない涼しい所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 保管の際にはアルミ袋を折り線で折りまげて保管してください。(5) 使用期限(ケースに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。

包装 76枚入(直径2.8cm)

登録商標

本剤にステロイド成分は配合されていません

開き口