

**効能** 蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ナンキンムシ、ノミ、イエタニ、マダニ、ツツガムシの忌避

**有効成分(原液100mL中)** ティート 12.0g

**添加物** 1,3-ブチレングリコール、二酸化ケイ素、ポリソルベート 80、エタノール、香料、噴射剤(保冷管及び取扱い上)の注意 ●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。●小児の手などかない所に保管すること。●缶のさびを防ぐため、水廻りや温氣の多い場所に置かないこと。●次の物には付着させないこと(収貯する場合がある)。食物、食器、玩具、床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、化粧製品、皮革製品、マーキュア等。●捨てる時は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでガスを抜くこと。●**使用期限**(缶底面に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、コンロ等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス : LPガス

**ガス抜きキャップ付き** (ガス抜きの注意事項) ●中身を使い切ってから、火気のない戸外で行うこと。●本品のキャップ以外は使用しないこと。●中身が残っている場合、液の飛散により周囲が汚れることがあるので、差し支えない所で行うこと。●いかにかからないように注意すること。

(ガス抜きの方法) 1.缶を新聞紙などを敷

いた平らで安定した所に置く。2.下図のように、①キャップを外し、②キャップを90°回して、③再び缶に差し込む。3.ガスが連續噴射するので、噴射音が消えるまでそのまま待つ。●廃棄の際は必ず自治体で定められた方法に従うこと。

●大量に使い残した缶の廃棄方法は、お客様相談窓口にお問い合わせください。  
外装フィルム、安全カバー、キャップ、ボタン

製造販売元 **muhi** 株式会社 池田模範堂  
富山県中新川郡上市町神田16番地  
(お客様相談窓口 ☎ 076-472-0911 (平日9:00~17:00))



**muhi**

販売名: ムヒの虫よけムシペールPS [第2類医薬品]

**使用方法** ●初めて使用する時は、キャップ上部の安全カバーを取除のこと。●使用前に缶を5~10回程度振って、腕、足などには約15cmの距離から噴霧すること。●噴霧気体を直接吸入しないように注意すること。●冷えて固くなることがあるので、同じ箇所に連続して3秒以上噴霧しないように注意すること。用法・用量 ●蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ナンキンムシ、ノミ、イエタニ、マダニの忌避: 本剤の適量を用時、腕、足など皮膚の露出部分に噴霧する。顔面、首筋などの場合は一度手のひらに噴霧してから塗布する。●ツツガムシの忌避: 本剤の適量を4~6時間毎に、皮膚の露出部分及びはさきものやズボンのそそなどにむらなく噴霧する。顔面、首筋などの場合は適量を一度手のひらに噴霧してから塗布する。用法・用量に関する注意 ●本剤は吸血害虫に対する忌避剤であって、疾病的治療薬ではない。●漫然とした使用をされ、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合には、保護者等の指導監督のもとで、以下の回数を目安に使用すること。なお、顔には使用しないこと。・6ヵ月未満の乳児には使用しないこと。・6ヵ月以上2才未満は、1日1回。2才以上12才未満は、1日1~3回。●本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。●定められた用法・用量を厳守すること。●目に入ったり、飲んだり、なりたり、吸い込んだりすることがないようにし、噴出した手で目をこすらないこと。●万一にに入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪くなる等の症状があわれた場合には、直ちに本剤でティートとエタノールが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。●目や口の周囲、粘膜や傷口など肌の弱い部分には使用しないこと。誤ったかかった場合は、直ちに水でよく洗うこと。●万一に異常に感じたときは、直ちに使用を中止すること。●本剤を噴霧又は塗布した後に手は、経過時間や使用時の痒等の状況を踏まえて、適宜、本剤を再度使用すること。●ツツガムシに対する忌避効果は認められているが、薬剤だけに頼らず、シャツ、ズボン、長靴などを使用し、肌を露出しないようにすること。●ツツガムシは見落しにくいので、生息している可疑な場所に立ち入り前に塗布すること。●シャツ、ズボンなどの衣服に噴霧する場合、織維の種類によっては本剤により変質する場合がある。合成繊維は変質しやすいので注意すること。●ストッキングなどの上に直接噴霧しないこと(生地が傷む場合がある)。

**使用上の注意** [してはいけないこと] (守らないと副作用が起こりやすくなる) 部位には使用しないこと、創傷面、目の周囲、粘膜等 (相談すること)  
1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状(発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(3)湿疹やだだれのある人。2.使用後、次の症状があわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮膚(発疹、発赤、かゆみ、はれ等)

本品は透明フィルムで包装しています。

内容量 200mL 第一石油類 80mL 水素ガス TS15

⑧ 登録商標 副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

第2類医薬品