

開き口

販売名 ムヒののどスプレー 口腔内消炎剤

ご使用に際して、この説明文書(ケース)を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 口内のただれがひどい人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書(ケース)をもって医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮ふ又は口腔	発疹・発赤・かゆみ又は刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書(ケース)をもって医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

用法・用量

1日、数回、適量を患部に噴射塗布してください。


<用法・用量に関する注意>

(1) 定められた用法、用量を守ってください。
(2) 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、のどに使用する場合には、声を出しながら噴射してください。
(3) のどや口内の患部の塗布用にのみ使用し、内服しないでください。
(4) 小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(5) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

使い方




① 容器のキャップをはずしてください。



② 「ア」と声を出しながら容器頭部を押して、患部に薬液を2~3回噴射塗布してください。

※ 使い始めは、数回空押ししてください。



③ 使用後は、ノズルをティッシュ等で拭き取り、キャップをしてください。

本品は大人の方も
お使いいただけます

MADE IN JAPAN 日本製



4 987426 002831

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

第3類医薬品

© やなせたかし／フレーベル館 TMS・NTV



効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎。

有効成分(100mL中)

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物…0.02g

添加物としてセチルピリジニウム塩化物、グリセリン、還元麦芽糖水アメ、クエン酸、クエン酸Na、水酸化Na、ボリオリキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、エタノールを含有します。

本剤は青紫色の透明な液体です

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わります)。
- (4) 薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落してください。
- (5) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出てくことがあります。
- (6) 使用期限(ケース底面及び容器底面に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

お客様相談窓口：株式会社池田模範堂

☎ 076-472-0911

[月~金(祝日を除く) 9:00~17:00]

発売元

muhi

株式会社 池田模範堂

富山県中新川郡上市町神田16番地

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社

奈良県橿原市上品寺町515