

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

販売名:ヒビケアFT

第3類医薬品

ひじ・ひざ・かかとの荒れ、ひび・あかぎれ治療薬

ヒビケアFT 軟膏

6つの有効成分配合で、ひじ・ひざ・かかとの荒れ、ひび・あかぎれ症状に効く



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に
相談すること

- (1) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、
かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) 湿疹やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が
あるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

効 能 ひじ・ひざ・かかとのあれ、ひび、あかぎれ、指先・手のひらのあれ、しもやけ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布する。

<用法・用量に関連する注意> (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。本剤の使用
開始目安年齢は生後1カ月以上。(2)目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で
洗うこと。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けること。(3)
本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。

成分とそのはたらき 有効成分(100g中) ビタミンA油0.5g(ビタミンAとして500000国際単位)(皮膚の代謝を改善し、
皮膚の荒れをなめらかにする)/アラントイン0.2g(割れた皮膚組織の修復を助ける)/パンテノール(プロビタミンB5)
1.0g(肌細胞の正常なはたらきを助ける)/トコフェロール酢酸エステル2.0g(血行を促進し、患部の回復を早める)/グリセリン
40.0g(保湿成分で、皮膚にうるおいを与える)/ジフェニヒドラミン0.5g(ひび・あかぎれに伴うかゆみをおさえる)
添加物としてエドト酸Na、BHT、ステアリアルコール、トリイソオクタン酸グリセリン、パルミチン酸セチル、ペヘニルアルコール、
マイクロクリスタリンワックス、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンペヘニルエーテル、クエン酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品
質が変わる)。(4)使用期限(ケース及びチューブに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないこと。使用
期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用すること。(5)ラミネートチューブは
破れにくい特長があるが、強く押すと中身が飛び出す場合がある。チューブ尻から順次軽く押し出すように
して使用すること。

お子さまが誤ってヒビケアFT軟膏を口にした場合

- ①まず、口の中の物をふき取ってあげること。
- ②少しなめた程度では影響はみられないが、たくさん口にするとなんかがあらわれることがある。
- ③1時間ほど様子を見て、呼吸などに異常がある場合は、医師に診てもらうこと。

お客様相談窓口 ☎076-472-0911
[月～金(祝日を除く) 9:00～17:00]

製造販売元

MUHI

株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡市町神田16番地

®登録商標