

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名：ムヒS 鎮痒消炎剤

第3類医薬品



使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
関係部位：皮膚 症状：発疹・発赤、かゆみ、はれ
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能 かゆみ、虫さされ、かぶれ、しっしん、じんましん、あせも、しもやけ、皮膚炎、ただれ
用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後3カ月以上です。(2) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。(3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分とそのはたらき 有効成分 (100g中)

成分	分量	はたらき
ジフェニヒドラミン	1.0g	かゆみをおさえます。
グリチルレチン酸	0.3g	生薬カンゾウ由来の成分で、炎症をおさえます。
ℓ-メントール	5.0g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dl-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。

添加物としてポリソルベート60、エデト酸Na、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、パラベン、オクチルドデカノール、1,3-ブチレングリコール、ステアリルアルコールを含有します。

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 使用期限(ケース及びチューブに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

お客様相談窓口 ☎ 076-472-0911
【月～金(祝日を除く) 9:00～17:00】

製造販売元

MUHI

株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地